



# FORMULACIÓN DE QUÍMICA ORGÁNICA

# Fortuna, 2010.



## FORMULACIÓN DE QUÍMICA ORGÁNICA

### 1. ALCANOS

Los alcanos son hidrocarburos saturados, ya que todos los enlaces entre carbonos son sencillos.

#### Nomenclatura:

Los cuatro primeros tienen nombre común, el resto se nombra con un prefijo indicativo del número de átomos del carbono, al que se le añade la terminación **-ano**



PREFIJO	Nº. ÁTOMOS CARBONO
Met-	Cadena de 1 átomo de carbono
Et-	Cadena de 2 átomos de carbono
Prop-	Cadena de 3 átomos de carbono
But-	Cadena de 4 átomos de carbono
Pent-	Cadena de 5 átomos de carbono
Hex-	Cadena de 6 átomos de carbono
Hept-	Cadena de 7 átomos de carbono
Oct-	Cadena de 8 átomos de carbono
Non-	Cadena de 9 átomos de carbono
Dec-	Cadena de 10 átomos de carbono

#### Nombre de Alcanos con más de 10 carbonos:

Nº. C	NOMBRE
11	UNDECANO
12	DODECANO
13	TRIDECANO
20	EICOSANO
21	HENEICOSANO
22	DOCOSANO
23	TRICOSANO
30	TRIACONTANO
31	HENTRIACONTANO
32	DOTRIACONTANO
40	TETRACONTANO
41	HENTETRACONTANO
50	PENTACONTANO
100	HECTANO







**Formula los siguientes compuestos:**

a) 2-metilpentano


b) 3, 3, 4-trimetilhexano.

## 2. ALQUENOS

Los alquenos son hidrocarburos no saturados que presentan al menos un doble enlace entre sus carbonos. También son denominados **hidrocarburos etilénicos**. Responden a la fórmula general  $\text{C}_n\text{H}_{2n}$ , si tienen sólo un doble enlace.

**Nomenclatura:**


Se nombran igual que los alcanos, pero sustituyendo el sufijo -ano por **-eno**.



Generalmente, es necesario indicar la posición del doble enlace a partir del propeno, lo cual se hace con un número localizador (el menor posible), que se sitúa delante del nombre del alqueno y se separa de éste con un guión. Ejemplos:




En el nombre del compuesto se indica la posición del doble enlace. Cuando hay más de un doble enlace, se utilizan los prefijos di-, tri-, etc. Ejemplo:




**Reglas para nombrar los alquenos ramificados:**

### CRITERIOS PARA ELEGIR CADENA PRINCIPAL

1. Se elige como cadena principal la que contiene mayor número de dobles enlaces.





2. A igualdad de número de dobles enlaces, se le da prioridad a la más larga.





## EJERCICIOS PROPUESTOS:

Nombra los siguientes compuestos:



Formula los siguientes compuestos:

a) 3,6-dimetil-1-octeno

b) 2,5-dimetil-2,3-hexadieno

## 3. ALQUINOS

Los alquinos son hidrocarburos no saturados con triple enlace entre dos de sus átomos de carbonos. También se les denominan **hidrocarburos acetilénicos**. Su fórmula es  $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$  (si tienen sólo un triple enlace).

### Nomenclatura:

Se nombran igual que los alcanos, pero ahora con terminación **-ino**.

etino (o acetileno):  $\text{CH} \equiv \text{CH}$

1 - butino:  $\text{CH} \equiv \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

Para nombrarlos y formularlos se aplican las mismas reglas que se indicaron para los alquenos. A partir del propino es necesario indicar la posición del enlace.

Al escribir el nombre, la terminación **-eno** es la que tiene la cadena principal y después se escribe **-ino**, con su número localizador correspondiente.

1 - hexen - 3 - ino:  $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH} - \text{CH}_3$


### Reglas para nombrar los alquinos ramificados:

#### CRITERIOS PARA ELEGIR CADENA PRINCIPAL


1. Se elige como cadena principal la que contiene mayor número de dobles y triples enlaces.
2. A igualdad de número de dobles y triples enlaces, se le da prioridad a la más larga.

## CRITERIOS PARA NUMERAR LA CADENA PRINCIPAL


1. Se empieza a numerar por el extremo que tenga el número localizador más bajo para los diferentes enlaces dobles y triples




2. A igualdad de localizador para dobles y triples enlaces, se numera por el extremo que tenga más cerca el doble enlace.





3. A igualdad, se empieza por el extremo que tenga el número localizador más bajo para los radicales.




4. A igualdad, se tiene en cuenta el orden alfabético




### Otros ejemplos:







Si el tercer enlace, por la izquierda, fuese triple, entonces se tendría en cuenta el radical y se nombraría así: 2 - etil - 1,8 - nonadien - 3,6 - diino.




### **EJERCICIOS PROPUESTOS:**

**Nombra los siguientes compuestos:**



**Formula los siguientes compuestos:**




## **4. HIDROCARBUROS CÍCLICOS**


Son hidrocarburos de cadena cerrada, ya sea saturadas o insaturada. No hay hidrocarburos cíclicos con triples enlaces, es decir, no hay cicloalquinos.

### ▪ **CICLOALCANOS**


Se nombran anteponiendo el prefijo “**ciclo**” al nombre hidrocarburo de cadena abierta equivalente. Ejemplo:



ciclopropano



ciclobutano



ciclopentano

**Con radicales:** Si tiene un sólo radical no es necesario matizar la posición. Ejemplo:








Si tiene varios radicales, se empezará a numerar por el carbono que corresponde al número localizador de los radicales más bajo, y que será uno de los "C" que tenga el radical, y se nombran por orden alfabético. Ejemplo:



A igualdad de número localizador, se tiene en cuenta el orden alfabético. Ejemplo:




Número localizador es 13, tanto empezando por el CH<sub>3</sub>, como por el CH<sub>2</sub> - CH<sub>3</sub>; por tanto, se recurre al orden alfabético.




## ▪ **CICLOALQUENOS**


Se nombran anteponiendo el prefijo "ciclo" al nombre del hidrocarburo de cadena abierta equivalente. Ejemplo:



ciclopropeno





ciclobuteno






1,3-ciclobutadieno

**Con radicales:** Se numera el doble o dobles enlaces de tal manera que resulte el número localizador más bajo para los radicales. Ejemplo:





Cuando hay un sólo enlace doble no es necesario especificar su posición, porque queda fijada por la situación de los radicales. Ejemplo:



### **EJERCICIOS PROPUESTOS:**

**Nombra los siguientes compuestos:**




**Formula los siguientes compuestos:**

a) metilciclohexano


b) 1,3-dimetilciclohexeno

## 5. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS


Los hidrocarburos aromáticos son derivados del benceno, bien por sustitución de algún átomo de hidrógeno del núcleo bencénico por radicales alquílicos, o bien por condensación del núcleo bencénico. Ejemplos:




Benceno ( $\text{C}_6\text{H}_6$ )



Antraceno



Naftaleno




Fenantreno


Los dobles enlaces se colocan alternos, es decir, uno sencillo y uno doble.

**Nomenclatura (Con radicales de menos de cuatro carbonos):**


- **Con un radical:** Cuando hay un único sustituyente sobre el anillo bencénico, el nombre de aquel se antepone a la palabra benceno. Ejemplos:




clorobenceno



propilbenceno





metilbenceno  
(tolueno)




etilbenceno







- **Con dos radicales:** Si existen dos sustituyentes, deben indicarse las posiciones de estos con los números (1,2), (1,3) ó (1,4), ó los prefijos orto- (o-), meta- (m-) o para- (p-), respectivamente. Si los radicales son distintos se nombran por orden alfabético, y si son iguales, mediante los prefijos di-, tri-... Ejemplos:




o-clorometilbenceno  
(o-clorotolueno)




m-clorometilbenceno  
(m-clorotolueno)




CH<sub>3</sub>  
p-clorometilbenceno  
(p-clorotolueno)



o-dimetilbenceno




m-etilmetilbenceno  
(m-etiltolueno)







CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub>  
p-dietilbenceno




- **Más de dos radicales:** En el caso de que haya más de dos sustituyentes, estos recibirán los números localizadores más bajos y se nombrarán por orden alfabético. Ejemplo:




4-cloro-2-etil-1-metilbenceno

A igualdad de número localizador, se empieza a numerar por el primer radical, por orden alfabético. Ejemplos:





CH<sub>3</sub>




1-cloro-2-etil-3-metilbenceno

1-etil-3-isopropil-5-vinilbenceno



1-etil-2,4-dimetilbenceno

El radical del benceno se denomina **fenilo**. Ejemplos:



Con cadenas lineales de 4 ó más carbonos el benceno se nombra como radical (fenil). Ejemplos:





3-fenilpentano



2-fenil-2-buteno



2-fenilbutano





3 – fenilhexano

Recordemos, que siempre y cuando el benceno actúe como radical, es decir, no tenga más sustituyentes, prevalece el nombre de la cadena lineal si tiene 4 carbonos o más, en caso contrario se nombra como radical del benceno.

### EJERCICIOS PROPUESTOS:

Nombra los siguientes compuestos:



Formula los siguientes compuestos:

a) p-metilisopropilbenceno.

b) 1-cloro-2,5-dimetilbenceno.


## 6. HALOGENUROS DE ALQUILO

Los halogenuros de alquilo son hidrocarburos donde uno o más átomos de hidrógeno han sido sustituidos por uno o más átomos de halógeno (cloro y bromo principalmente). Su grupo funcional es –X, donde X es un halógeno.






Los fenoles son derivados del benceno que resultan de sustituir uno o más átomos de hidrógeno del anillo bencénico por uno o más grupos -OH. Ejemplos:



**La función alcohol es preferente sobre los dobles y triples enlaces.** Ejemplos:




## 8. ÉTERES

Son sustancias que resultan de la unión de dos radicales alquilo a un átomo de oxígeno. Su grupo funcional es: - O -.

### Nomenclatura:

Se nombran utilizando la terminación **-éter-** después del nombre de los dos radicales, siempre por orden alfabético; por último, cuando los dos radicales son iguales, se antepone el prefijo di- al nombre del radical seguido del sufijo -éter. Ejemplos:




También se pueden nombrar intercalando el término **-oxi-** entre los nombres de los dos radicales ligados al oxígeno, para ello, el radical más corto es el que acaba en **oxi**, y el radical más largo acaba en **ano**, los ejemplos de arriba se nombrarían como Metoxietano y Etoxietano. Se aconseja nombrarlos según la primera forma, por ser más sencilla.


## 9. ALDEHÍDOS Y CETONAS

Los aldehídos y las cetonas se caracterizan por tener como grupo funcional un doble enlace **C=O (grupo carbonilo)** en su estructura. La fórmula general de los aldehídos es R - CHO, y la de las cetonas, R - CO - R'.

### ALDEHÍDOS




### CETONAS




### Nomenclatura:


Los aldehídos se nombran sustituyendo la terminación “o” del hidrocarburo, del que proceden, por la terminación “**al**”. La I.U.P.A.C. admite en determinados casos, nombres propios, tales como el formaldehído y el acetaldehído:



metanal  
(formaldehído)



etanal  
(acetaldehído)



propanal

**No hay que matizar la posición del aldehído porque va en el extremo.**

Si el aldehído no está en la cadena principal, se denominara **formil**.

**El grupo C=O (grupo carbonilo), tiene prioridad frente a todas las funciones vistas hasta ahora;** por eso, en los aldehídos las cadenas se empiezan a numerar por el “C” que contiene dicho grupo; y en las cetonas, se numera de tal manera, que el CO tenga el número localizador menor.

Las cetonas se nombran sustituyendo la terminación “o” del hidrocarburo, del que proceden, por la terminación “**ona**”.

La cetona más sencilla es la de tres átomos de carbono ( $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$ ), llamada propanona o acetona ( denominación aceptada por la I.U.P.A.C.).

butanona:  $\text{H}_3\text{C} - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

butanodiona:  $\text{H}_3\text{C} - \text{CO} - \text{CO} - \text{CH}_3$




A partir de la butanona hay que indicar la posición del C=O.

2-pentanona:  $\text{H}_3\text{C} - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

Si actúa como radical se usa el prefijo **oxo-**. Es decir, si hay varios grupos funcionales con preferencia sobre la cetona, el oxígeno del carbonilo (C=O) se nombra como prefijo del hidrocarburo con la palabra oxo. **La función aldehído domina sobre la función cetona.**




Ej.  $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CHO}$                       3-oxobutanal.

Otros ejemplos:



### EJERCICIOS PROPUESTOS:

**Nombra los siguientes compuestos:**



**Formula los siguientes compuestos:**







gánicos por un radical, pero con la diferencia de que el enlace oxígeno-metal es sobre todo iónico, mientras que el enlace oxígeno-radical es predominantemente covalente.



El grupo funcional que caracteriza a los ésteres es  $-\text{COO}-$ , y su fórmula general es: **R - COO - R'**.


### Nomenclatura:

Los ésteres se nombran sustituyendo la terminación  $-\text{oico}$  del ácido del que derivan por **-ato**, seguido de la preposición **"de"** y del nombre radical terminado en **-ilo**. Ejemplos:









### EJERCICIOS PROPUESTOS:

**Nombra los siguientes compuestos:**



c.





**Formula los siguientes compuestos:**

- a. 2-metil-1,3-butanodiol
- b. Metilpropanal
- c. Ácido 2-pentenoico
- d. Propanoato de etilo
- e. 3,3-dimetilpentanodiona
- f. Propinal
- g. Metanoato de propilo
- h. 1,2,3-propanotriol

## 12. AMINAS

Los compuestos nitrogenados son aquellos que contienen nitrógeno en su constitución molecular.

Las aminas se pueden considerar derivados del amoníaco ( $\text{NH}_3$ ), que se obtienen al sustituir uno, dos o sus tres hidrógenos por radicales. Cuando es un hidrógeno el que es remplazado por un radical, se forman aminas primarias, secundarias si son dos, y terciarias al sustituir los tres hidrógenos.

**Nomenclatura:**


Las aminas se nombran anteponiendo a la terminación **-amina**, por orden alfabético, los nombres de los radicales unidos a ella. Si hubiese varios radicales repetidos, se emplearán los prefijos di-, tri-, etc.

$\text{R} - \text{NH}_2$                       **AMINA PRIMARIA**

$\text{R} - \text{NH} - \text{R}'$                       **AMINA SECUNDARIA**

$\text{R} - \text{N} - \text{R}'$                       **AMINA TERCIARIA**  
|  
 $\text{R}''$

El grupo  $-\text{NH}_2$  como radical, se nombra como **amino**. Ejemplo:




Ejemplos:








N-metiletanamida



N-metilpropanamida



N, N-dimetilpropanamida



2-fenil-4-metil-3-pentenamida

## **APÉNDICE I**

Si coexisten varios grupos funcionales en un compuesto, el sufijo que se cita al final del nombre se referirá exclusivamente al grupo funcional principal, con el siguiente orden de prioridad:

	<b>FUNCIÓN</b>
1º	<b>ÁCIDOS CARBOXÍLICOS</b>
2º	<b>ÉSTERES</b>
3º	<b>AMIDAS</b>
4º	<b>ALDEHÍDOS</b>
5º	<b>CETONAS</b>
6º	<b>ALCOHOLES</b>
7º	<b>FENOLES</b>
8º	<b>AMINAS</b>
9º	<b>ÉTERES</b>
10º	<b>ALQUENOS</b>
11º	<b>ALQUINOS</b>
12º	<b>ALCANOS Y HALOGENUROS DE ALQUILO</b>

## **APÉNDICE II: SUFIJOS**

	<b>FUNCIÓN</b>	<b>SUFIJO</b>
1º	<b>ÁCIDOS CARBOXÍLICOS</b>	<b>-oico</b>
2º	<b>ÉSTERES</b>	<b>-ato de -ilo</b>
3º	<b>AMIDAS</b>	<b>-amida</b>
4º	<b>ALDEHÍDOS</b>	<b>-al</b>
5º	<b>CETONAS</b>	<b>-ona</b>
6º	<b>ALCOHOLES</b>	<b>-ol</b>
7º	<b>FENOLES</b>	<b>-ol</b>
8º	<b>AMINAS</b>	<b>-amina</b>
9º	<b>ÉTERES</b>	<b>-éter</b>
10º	<b>ALQUENOS</b>	<b>-eno</b>
11º	<b>ALQUINOS</b>	<b>-ino</b>
12º	<b>ALCANOS Y HALOGENUROS DE ALQUILO</b>	<b>-ano</b>